

## Доцетаксел ХС412 (европейский протокол) Рак желудка

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1           | Доцетаксел             | 75                           | 0,9% NaCl    | 250 мл          | 1 час          | внутривенно   |

### График введения препаратов:

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Доцетаксел |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

#### Сопутствующая медикация:

Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Ford H.E.R. et al., Lancet Oncol 15: 78ff, 2014.

