

Паклитаксел / Рамуцирумаб ХА149 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Паклитаксел	80	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1, 15	Рамуцирумаб	8 мг/кг	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Паклитаксел																												
Рамуцирумаб																												

Дополнительная информация

Примечание:

Рекомендована премедикация - 30 мг

Дифенгидрамина.

Рамуцирумаб также можно применять в монотерапии.

Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.

Сопутствующая медикация Паклитаксела:

Дексаметазон, 20 мг внутривенно за 30 минут до

Паклитаксела или Дексаметазон - 20 мг орально за 6 и

12 часов до Паклитаксела. Рекомендована

дополнительная премедикация 50 мг Ранитидина и 30

мг Дифенгидрамина.

Разведенные растворы Паклитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016.

Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Wilke H.J. et al., Lancet Oncol 15: 1224ff, 2014; Fuchs

C.S. et al., Lancet 383: 31ff, 2014.

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

