

Оксалиплатин / Лейковорин / 5FU (OFF) ХС752 (сутки 8, 22) (европейский протокол) Рак поджелудочной железы и холангиоцеллюлярная карцинома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
8, 22	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно
1, 8, 15, 22	Фторурацил	2000	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Кальция фолинат																														
Оксалиплатин																														
Фторурацил																														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Количество циклов: пока заболевание прогрессирует.

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-фторурацила должен применяться перед 5-фторурацилом.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Pelzer U. et al., Onkologie 32: 99ff, 2009.