

Митомицин / 5FU + RT ХА149 (европейский протокол) Рак анального канала

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Митомицин	12	-	0	Болюс	внутривенно
1-5, 24-28	Флюороурацил	750	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Митомицин																														
Флюороурацил																														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
1

Примечание:

Повторно: не назначается!

Непрерывная инфузия 5FU в течение первой и последней недели радиотерапии.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

UKCCCR Anal Cancer Trial Working Party, Lancet 348: 1049ff, 1996; Bartelink H. et al., J Clin Oncol 15: 2040ff, 1997.

