

## Винорелбин (перорально) ХА149 (европейский протокол) - Часть 1 Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1           | Винорелбин             | 60                           | -            | 0               | -              | перорально    |

### График введения препаратов:

| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Винорелбин |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |   |   |   |   |   |   |

### Дополнительная информация

#### Примечание:

В случае нейтропении (один раз при 4 степени по ВОЗ или два раза при 3 степени по ВОЗ):

- В течение первых трех недель после начала лечения сохранять дозу 60 мг/м<sup>2</sup>/неделя.
- (\*) В течение следующих недель снижать дозу с 80 мг/м<sup>2</sup>/неделя до 60 мг/м<sup>2</sup>/неделя. Смотрите - Винорелбин (перорально) ХА149 (европейский протокол) - Часть 2.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Jassem J. et al., Ann Oncol 12: 1375ff, 2001.

ПОВТОРНО НА:  
8 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
3

