

Капецитабин / Доцетаксел ХС416 (европейский протокол) Саркома мягких тканей

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1, 8 | Гемцитабин | 900 | 0,9% NaCl | 500 мл | 30 минут | внутривенно |
| 8 | Доцетаксел | 100 | 0,9% NaCl | 250 мл | 1 час | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Гемцитабин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Доцетаксел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
3

Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

Сопутствующая медикация: Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Maki R.G. et al., J Clin Oncol 25: 2755ff, 2007.

