

## Ипилимумаб ХА149 (европейский протокол) Меланома

| Дни<br>терапии | Лекарствен<br>ное<br>средство | Дозировка,<br>мг/м <sup>2</sup> | Растворите<br>ль | Объем<br>(мл /<br>шт) | Время<br>введения | Путь<br>введения |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1              | Ипилимумаб                    | 3 мг/кг                         | 0,9% NaCl        | 250 мл                | 90 минут          | внутривенно      |

### График введения препаратов:

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ипилимумаб |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
4

#### Примечание:

Ипилимумаб разводят до 1,0-4,0 мг/мл.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Hodi F.S. et al., N Engl J Med 363: 711ff, 2010.

