

## Винфлунин ХС882 (европейский протокол) Рак мочевого пузыря

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1           | Винфлунин              | 320                          | 0,9% NaCl    | 100 мл          | 20 минут       | внутривенно   |

### График введения препаратов:

|           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Винфлунин |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

**Внимание!** Необходимо обеспечить полную защиту от попадания света.

**Внимание!** Тромбофлебит; в случае периферийного доступа после Винфлунина вводится 100 мл 0,9% раствора NaCl.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Krzakowski M. et al., J Clin Oncol 28: 2167ff, 2010.

