ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Цисплатин / Иринотекан (локальный протокол) Мелкоклеточный рак легкого - МРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8	Иринотекан	65	0,9% NaCl	250 мл	90 минут	внутривенно
1, 8	Цисплатин	30	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Иринотекан																												
Цисплатин																												

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:
Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):
Сопутствующая медикация:
Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв $MgSO_4$ внутривенно в течение 60 мин.
200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.
Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.
Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.
Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно
В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.
Паспортная часть: нозология – рак легкого; код по мкб -10 – с 33, с 34.
Потенциальные пользователи – отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.
Авторство: Национальный институт рака
Литература:
Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.