

## Винбластин (локальный протокол) Ходжкинская лимфома

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1           | Винбластин             | 10 мг (const)                | 0,9% NaCl    | 100 мл          | 10 минут       | внутривенно   |

### График введения препаратов:

| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Винбластин |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |   |   |   |   |   |   |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
8 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
10

#### Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.

Важно - препарат принимают постоянно под контролем гемограммы еженедельно. При уровне лейкоцитов  $<3.0 \cdot 10^9/\text{л}$  - прекращение терапии до восстановления уровня лейкоцитов.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

