

Панобиностат / Бортезомиб / Дексаметазон ХА149 (европейский протокол) Множественная миелома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 4, 8, 11	Бортезомиб	1,3	-	0	-	подкожно
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	Дексаметазон	20 (const)	-	0	-	перорально
1, 3, 5, 8, 10, 12	Панобиностат	20 мг (const)	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Бортезомиб																					
Дексаметазон																					
Панобиностат																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
12

Примечание:

По окончании первой фазы лечения (то есть восьми трехнедельных циклов), пациенты с улучшениями могут перейти ко второй фазе (четыре 6-недельных цикла), в течение которых назначают Панобиностад по такой же схеме, однако Бортезомиб назначается один раз в неделю на 1, 2, 4 и 5 неделе, а Дексаметазон - в те же и следующие дни после Бортезомиба.

Концентрация Бортезомиба - 2,5 мг/мл.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

San-Miguel J.F. et al., Lancet Oncol 15: 1195ff, 2014.