

5FU / Лейковорин / Оксаліплатин / Доцетаксел (FLOT) ХС412 (європейський протокол) Рак шлунку

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доцетаксел	50	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Кальцію фолінат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 години	внутрішньовенно
1	Оксаліплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 години	внутрішньовенно
1	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доцетаксел														
Кальцію фолінат														
Оксаліплатин														
Флюороурацил														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
15 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Супутня медикація:

Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Al-Batran S.E. et al., Ann Oncol 19: 1882ff, 2008.