

Іфосфамід / Доксوروبіцин (EORTC) XC448 (європейський протокол) Саркома м'яких тканин

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доксوروبіцин	75	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Іфосфамід	5000	0,9% NaCl	500 мл	24 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Доксوروبіцин																					
Іфосфамід																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Месна: 20% дози Іфосфаміду, через 0, 4 - 8 год. після прийому Іфосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

Підвищений ризик токсичності для ЦНС, якщо доза альбуміну ≤ 3.5 г/дл.

Увага! Доксوروبіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз ≥ 500 мг/м².

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Santoro A. et al., J Clin Oncol 13: 1537ff, 1995.

