

## СОМР +Ритуксимаб ХС346 + ХА090 (європейський протокол) НХЛ гостра

| Дні терапії | Лікарський засіб                          | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення       | Шлях введення   |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1           | Вінкрестин                                | 1,4(*)                       | 0,9% NaCl | 100 мл          | 1 годину           | внутрішньовенно |
| 1           | Ліпосомний комплекс доксорубіцину цитрату | 50                           | 0,9% NaCl | 100 мл          | 1 годину           | внутрішньовенно |
| 1-5         | Преднізон                                 | 40                           | -         | 0               | 10 хвилин          | перорально      |
| 1           | Ритуксимаб                                | 375                          | 0,9% NaCl | 500 мл          | -                  | перорально      |
| 1           | Циклофосфамід                             | 750                          | 0,9% NaCl | 500 мл          | 5 годин (3 години) | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Вінкрестин</b>                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Ліпосомний комплекс доксорубіцину цитрату</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Преднізон</b>                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Ритуксимаб</b>                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Циклофосфамід</b>                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
8

#### Примітка:

Ритуксимаб: Початкова швидкість інфузій - 50 мг/год; через 30 хвилин її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Подальші дози вводяться на початковій швидкості 100 мг/год та збільшуються на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну.

Ліпосомальний комплекс доксорубіцину цитрату розводять до 0,4-1,2 мг/мл.

(\*) Вінкрестин, макс. 2 мг.

Месна: 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4, 8 год. після прийому Циклофосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Luminari S. et al., Ann Oncol 21: 1492ff, 2010.