

## ДНАР ХС408 (європейський протокол) НХЛ гостра

| Дні терапії | Лікарський засіб   | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення               | Шлях введення   |
|-------------|--------------------|------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1           | Дексаметазон       | 40 (const)                   | -         | 0               | 24 години                  | перорально      |
| 2           | Цисплатин          | 100                          | 0,9% NaCl | 1000 мл         | 3 години<br>Кожні 12 годин | внутрішньовенно |
| 1-4         | Цитозин-арабінозид | 2 x 2000                     | 0,9% NaCl | 2*500           | -                          | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Дексаметазон</b>       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Цисплатин</b>          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Цитозин-арабінозид</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
2

#### Примітка:

Цитозин-арабінозид: Дозування 1000 мг/м<sup>2</sup> у пацієнтів >70 років.

Дексаметазон: Прийом перорально або внутрішньовенно у вигляді інфузій протягом 15 хвилин.

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Velasquez W. et al., Blood 71: 117ff, 1988.