ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

# Цисплатин / Етопозид / Блеоміцин (доба 1-5: XC788; доба 8, 15: XA149) (європейський протокол) Рак яєчка

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м$^2$ | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 8, 15 | Блеоміцин | 30 (const) | - | 0 | Болюс | внутрішньовенно |
| 1-5 | Цисплатин | 20 | 0,9% NaCl | 500 мл | 30 хвилин | внутрішньовенно |
| 1-5 | Етопозид | 100 | 0,9% NaCl | 500 мл | 1 година | внутрішньовенно |

**Графік введення препаратів:**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Блеоміцин** | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| **Цисплатин** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Етопозид** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:**
**22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:**
**4**

**Примітка:**
**Якщо загальна доза становить ≥200 мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl.**
**Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥60 мл/хв):**
**Супутня медикація:**
**Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв $MgSO_4$ внутрішньовенно протягом 60 хв.**
**200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.**
**Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.**
**Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler**
**(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).**
**Остання зміна змісту: січень 2016 р.**
**Література:**

**Williams S.D. et al., N Engl J Med 316: 1435ff, 1987.**