

## MINE ± R (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1-3         | Іфосфамід        | 1330                         | 0,9% NaCl | 500 мл          | 24 години    | внутрішньовенно |
| 1-3         | Месна            | 1330                         | 0,9% NaCl | 500 мл          | 24 години    | внутрішньовенно |
| 1           | Мітоксантрон     | 8                            | 0,9% NaCl | 100 мл          | 2 години     | внутрішньовенно |
| 1-3         | Етопозид         | 65                           | 0,9% NaCl | 500 мл          | 1 години     | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| <b>Іфосфамід</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Месна</b>        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Мітоксантрон</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Етопозид</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Мета - надання діагностичної та лікувальної допомоги хворим з рецидивом лімфом у Національному інституті раку.

Важливо - Месна вводиться за схемою, потім 500 мг/сут в/венно, починаючи через 4 години після закінчення інфузії Іфосфаміду, 1-3 день.

Авторство: [Національний інститут раку](#)