

## Іфосфамід (локальний протокол) Саркома матки

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1-5         | Іфосфамід        | 1500                         | 0,9% NaCl | 500 мл          | 1 година     | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

|           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Іфосфамід |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Клінічний протокол Національного інституту раку з лікування сарком матки.

Розроблено протокол для консультативної поліклініки та стаціонарного відділення гінекології, радіології, хіміотерапії Національного інституту раку.

Важливо - Месна (Mesna) 20% дози Іфосфаміду, через 0, 4 - 8 год. після прийому Іфосфаміду.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

