

## Паклітаксел / Карбоплатин / Флюороурацил (локальний протокол) Рак голови та шиї

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник  | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1           | Карбоплатин      | AUC 6                        | 5% Глюкоза | 500 мл          | 1 година     | внутрішньовенно |
| 1           | Паклітаксел      | 175                          | 0,9% NaCl  | 500 мл          | 3 години     | внутрішньовенно |
| 3-5         | Флюороурацил     | 1000                         | 0,9% NaCl  | 1000 мл         | 24 години    | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| <b>Карбоплатин</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Паклітаксел</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Флюороурацил</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
5

#### Примітка:

Локальний протокол медичної допомоги хворих на:

- рак губи;
- рак ротової порожнини;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхньощелепної пазухи;
- рак слинних залоз.

Протокол призначений для відділення пухлин голови та шиї, відділення променевої терапії та відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)