

## Ніволумаб ХА149 (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1           | Ніволумаб        | 3 мг/кг                      | 0,9% NaCl | 100 мл          | 1 година     | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ніволумаб |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
15 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Ніволумаб розводять до 1-10 мг/мл.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)  
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Brahmer J. et al., N Engl J Med 373: 123ff, 2015.

